

Total number of Pages : 16

Subject Code : C2



B15-GM (New)
EN/AS/BN

2015

GENERAL MATHEMATICS (New Course)

Full Marks : 80
Pass Marks : 24

Time : Three hours

*The figures in the margin indicate full marks
for the questions.*

All questions are compulsory.

আটাইবোৰ প্রশ্ন বাধ্যতামূলক।

সব ওলো প্রশ্নই বাধ্যতামূলক।

Take $\pi = \frac{22}{7}$ wherever necessary
প্রয়োজন অনুসৰি $\pi = \frac{22}{7}$ ল'বা।
প্রয়োজন অনুযায়ী $\pi = \frac{22}{7}$ নেবে।

Section – A

1. In the following real numbers, which one is non-terminating repeating decimal expansion ?

তলৰ বাস্তৱ সংখ্যাবোৰৰ কোনটো নিৰবধি পৌনঃপুনিক হ'ব ?

নীচৰ বাস্তৱ সংখ্যা গুলোৰ কোনটি অসীমিত পৌনঃপুনিক হ'ব ?

(a) $\sqrt{3}$

(b) π

(c) $\frac{1}{7}$

(d) $\frac{13}{125}$

2. Find the correct answer :

$\sqrt{7}$ is

(a) an integer

(b) a rational number

(c) a prime number

(d) an irrational number

শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা :

$\sqrt{7}$ এটা

(a) অখণ্ড সংখ্যা

(b) পৰিমেয় সংখ্যা

(c) মৌলিক সংখ্যা

(d) অপৰিমেয় সংখ্যা



BELLAL HOSSAIN MONDAL

শুদ্ধ উত্তৰটি বেছে নাও :

$\sqrt{7}$ একটি

- (a) অখণ্ড সংখ্যা
- (b) পৰিমেয় সংখ্যা
- (c) মৌলিক সংখ্যা
- (d) অপৰিমেয় সংখ্যা

3. Sum of the zeros of the cubic polynomial

$P(x) = 3x^3 - 5x^2 - 11x - 3$ is

$P(x) = 3x^3 - 5x^2 - 11x - 3$ ত্ৰিঘাত বহুপদ টোৰ শূন্য বোৰৰ যোগফল হ'ব

ত্ৰিঘাত বহুপদ ৰাশি $P(x) = 3x^3 - 5x^2 - 11x - 3$ এর শূন্যগুলোর যোগফল হবে

- (a) 5
- (b) 11
- (c) 3
- (d) $\frac{5}{3}$



BELLAL HOSSAIN MONDAL

4. Under what condition, roots of the quadratic equation $x^2 + px + q = 0$ will be real and unequal ?

কি চৰ্তত দ্বিঘাত সমীকৰণ $x^2 + px + q = 0$ ৰ মূল দুটা বাস্তৱ আৰু অসমান হ'ব ?

কী সৰ্তে দ্বিঘাত সমীকৰণ $x^2 + px + q = 0$ এর মূল হয় বাস্তব এবং অসমান হবে ?

- (a) $p^2 - 4q = 0$
- (b) $p^2 - 4q < 0$
- (c) $p^2 - 4q > 0$
- (d) $p^2 - 4q \geq 0$

5. If the sides of two similar triangles are in the ratio 4 : 9, then the areas of the triangles are in the ratio

যদি দুটা সদৃশ ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ অনুপাত 4 : 9 তেন্তে ত্ৰিভুজ দুটাৰ কালিৰ অনুপাত হ'ব

দুটি সদৃশ ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ অনুপাত যদি 4 : 9 হয় তেন্তে ত্ৰিভুজ দুটিৰ কালিৰ অনুপাত হ'ব


- (a) 2 : 3
(b) 4 : 9
(c) 81 : 16
(d) 16 : 81

6. Distance between the points (1, 0) and (-1, 0) is

(1, 0) আৰু (-1, 0) বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ল -

(1, 0) আৰু (-1, 0) বিন্দু দুটিৰ মধ্যবৰ্তী দূৰত্ব হ'ব

- (a) 0
(b) $\sqrt{2}$
(c) 1
(d) 2



BELLAL HOSSAIN MONDAL

7. If the angle of elevation of the sun is 45° , then the ratio between the tower and its shadow is

যদি সূৰ্যৰ উঠন কোণ 45° তেন্তেহলে এটা স্তম্ভ আৰু ইয়াৰ ছাঁৰ অনুপাত হ'ব

যদি সূৰ্যৰ উন্নতি কোণ 45° হয় তেন্তেহলে এটি স্তম্ভ আৰু এটিৰ ছায়াৰ অনুপাত হ'ব

- (a) 1 : 1
(b) $1 : \sqrt{2}$
(c) $\sqrt{2} : 1$
(d) $1 : \sqrt{3}$

8. Area of a sector of angle P(in degrees) of a circle with radius R is

1

R ব্যাসার্ধ যুক্ত এটা কূটর P(ডিগ্রীত) কোণৰ এটা কৃতকলাৰ কালি হ'ল

R ব্যাসাৰ্ধ যুক্ত এককটি কূতৰ P(ডিগ্রী) কোণেৰ এককটি কৃতকলাৰ কালি হ'বে

(a) $\frac{P}{180} \times 2\pi R$

(b) $\frac{P}{180} \times \pi R^2$

(c) $\frac{P}{360} \times 2\pi R$

(d) $\frac{P}{720} \times 2\pi R^2$



BELLAL HOSSAIN MONDAL

9. The wickets taken by a bowler in 10 Cricket matches are as follows :

1

2 6 4 5 0 3 1 3 2 3

Mode of the data is

এজন বলোৱে 10 খন ক্ৰিকেট খেলত দখল কৰা উইকেটৰ সংখ্যা তলত দিয়া ধৰণৰ :

2 6 4 5 0 3 1 3 2 3

তথ্যখিনিৰ বহুলত হ'ব

10 টি ক্ৰিকেট খেলায় একজন বোলাৱেৰে দখল কৰা উইকেটৰ সংখ্যা নিম্নৰূপ :

2 6 4 5 0 3 1 3 2 3

তথ্যটিৰ বহুলত হ'ব

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 5

10. A die is thrown once, the probability of getting a prime number is

এটা পাশা এবার মারি পাঠিয়েলে মৌলিক সংখ্যা পোবার সম্ভাবিতা হ'ল

একটি পাশা একবার প্রক্ষেপ করলে মৌলিক সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবিতা হবে

(a) $\frac{1}{6}$

(b) $\frac{5}{6}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) $\frac{1}{3}$

11. The value of $\frac{1 + \tan^2 \theta}{1 + \cot^2 \theta}$ is

$\frac{1 + \tan^2 \theta}{1 + \cot^2 \theta}$ ৰ মান হ'ব

$\frac{1 + \tan^2 \theta}{1 + \cot^2 \theta}$ এর মান হবে

(a) $\sec^2 \theta$

(b) -1

(c) $\cot^2 \theta$

(d) $\tan^2 \theta$



BELLAL HOSSAIN MONDAL

12. Three metallic spheres of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. The radius of the resulting sphere is

1

৬ ছে.মি., ৮ ছে.মি. আৰু ১০ ছে.মি. ব্যাসার্ধৰ তিনিটা ধাতুৰ গোলক গুলোই এটা নতুন গোলক তৈয়াৰ কৰা হ'ল। নতুন গোলকটোৰ ব্যাসার্ধ হ'ব

৬ সে.মি., ৮ সে.মি. আৰু ১০ সে.মি. ব্যাসার্ধৰ তিনিটা ধাতুৰ গোলক গুলিয়ে একটা নতুন গোলক তৈৰি কৰা হ'ল। নতুন গোলকটিৰ ব্যাসার্ধ হ'ব

- (a) 12 cm (ছে.মি.) (সে.মি.)
(b) 24 cm (ছে.মি.) (সে.মি.)
(c) 48 cm (ছে.মি.) (সে.মি.)
(d) 480 cm (ছে.মি.) (সে.মি.)



BELLAL HOSSAIN MONDAL

Section – B

13. Using Euclid's division lemma, show that any positive odd integer is of the form $4q + 1$ or $4q + 3$ where q is some integer.

2

ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ব্যৱহাৰ কৰি দেখুওৱা যে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড অখণ্ড সংখ্যাই $4q + 1$ নাইবা $4q + 3$ আছিল য'ত q কোনোবা এটা অখণ্ড সংখ্যা।

ইউক্লিড বিভাজন প্ৰতিজ্ঞা ব্যৱহাৰ কৰে দেখাও যে, যে কোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা $4q + 1$ বা $4q + 3$ আকৃতিৰ যেনে q এটি অখণ্ড সংখ্যা।

14. Which term of the Arithmetic Progression :

2

3, 8, 13, 18, is 78 ?

3, 8, 13, 18, সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ কোনটো পদ 78 ?

3, 8, 13, 18, সমান্তৰ প্ৰগতিটিৰ কোন পদটি 78 ?

15. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points $(-1, 7)$ and $(4, -3)$ in the ratio $2 : 3$

2

$(-1, 7)$ আৰু $(4, -3)$ বিন্দু সংযোগী রেখাখণ্ডক $2 : 3$ অনুপাতত ভাগ কৰা বিন্দুটোৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰা।

$(-1, 7)$ এবং $(4, -3)$ বিন্দু সংযোগী রেখা খণ্ডটিকে $2 : 3$ অনুপাত বিভক্ত কৰা বিন্দুটিৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰো।

16. Evaluate :

2

মান নিৰ্ণয় কৰা :

মান নিৰ্ণয় কৰো :

$$\frac{5 \cos^2 60^\circ + 4 \sec^2 30^\circ - \tan^2 45^\circ}{\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ}$$



BELLAL HOSSAIN MONDAL

17. If A , B and C are interior angles of a triangle ABC , then show that

$$\sin \left(\frac{B+C}{2} \right) = \cos \frac{A}{2}.$$

2

যদি A , B আৰু C কোন কেইটা ABC ত্ৰিভুজৰ অন্তঃকোণ হয়, তেন্তে দেখুওৱা যে -

$$\sin \left(\frac{B+C}{2} \right) = \cos \frac{A}{2}.$$

যদি ABC ত্ৰিভুজৰ অন্তঃকোণ গুলো A , B এবং C হয় তৰে দেখাও যে,

$$\sin \left(\frac{B+C}{2} \right) = \cos \frac{A}{2}.$$

18. A box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white ?

2

এটা বাকচত ৩টা নীলা, ২টা বগা আৰু ৪ বঙা মাৰ্বল আছে। যদি এটা মাৰ্বল যাদৃচ্ছিকভাবে
 অনা হয়, তেন্তে সেইটো বগা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি ?

একটি বাক্সে ৩নি নীল, ২টি সাদা এবং ৪ টি লাল মাৰ্বল আছে। যদি যাদৃচ্ছিক ভাবে একটি
 মাৰ্বল বের করা হয় তবে সেটি সাদা হওয়ার সম্ভাৱিতা কী ?

19. Prove that :

প্রমাণ কৰা যে :

প্রমাণ কৰো যে :

$$(\sin A + \operatorname{cosec} A)^2 + (\cos A + \sec A)^2 = 7 + \tan^2 A + \cot^2 A$$



BELLAL HOSSAIN MONDAL

2

Section - C

20. Divide $3x^2 - x^3 - 3x + 5$ by $x - 1 - x^2$ and verify the division algorithm.

3

$x - 1 - x^2$ ৰে $3x^2 - x^3 - 3x + 5$ ক হৰণ কৰা আৰু বিভাজন কলনবিধিটো সত্যাপন কৰা।

$3x^2 - x^3 - 3x + 5$ কে $x - 1 - x^2$ দ্বাৰা হৰণ কৰো এবং বিভাজন পদ্ধতিটি সত্যাপন কৰো।

21. For which values of p does the pair of equations given below has unique solution ?

3

p ৰ কি মানৰ বাবে তলত দিয়া সমীকৰণবোৰৰ এটা অদ্বিতীয় সমাধান আছে ?

p ৰ কী মানের জন্য নীচের সমীকরণ দুটির একটি অদ্বিতীয় সমাধান থাকবে ?

$$4x + py + 8 = 0$$

$$2x + 2y + 2 = 0$$

22. Find the roots of the following equation :

3

তলৰ সমীকৰণটোৰ মূল নিৰ্ণয় কৰা :

নীচের সমীকরণটির মূল নিৰ্ণয় কৰো :

$$3x^2 - 5x + 2 = 0$$



BELLAL HOSSAIN MONDAL

23. If the following quadratic equation has two equal roots, then find the value of k.

3

যদি তলৰ দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ মূল দুটা সমান হয়, তেন্তে kৰ মান নিৰ্ণয় কৰা :

নীচের দ্বিঘাত সমীকরণটির মূল হয় সমান হলে kৰ মান নিৰ্ণয় কৰো :

$$2x^2 + kx + 3 = 0$$

Or/নাইবা/অথবা

Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365.

দুটা ক্রমিক যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা উলিওৱা যাৰ বৰ্গৰ যোগফল 365।

দুটি ক্রমিক যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰো যাদেৰ বৰ্গেৰ সমষ্টি 365।

24. The first term of an AP is 5 and last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference.

3

এটা সমান্তৰ প্রগতির প্রথম পদ 5, অন্তিম পদ 45 আৰু যোগফল 400; মুঠ পদৰ সংখ্যা আৰু সাধাৰণ অন্তৰ নিৰ্ণয় কৰা।

একটি সমান্তৰ প্রগতির প্রথম পদ 5, অন্তিম পদ 45 এবং সমষ্টি 400। মোট পদের সংখ্যা এবং সাধাৰণ অন্তৰ নিৰ্ণয় কৰো।

25. If a line intersects sides AB and AC of a $\triangle ABC$ at D and E respectively and is parallel to BC. Prove that $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$. 3

যদি এদাল বেখাই $\triangle ABC$ ৰ AB আৰু AC বাহক ক্ৰমে D আৰু E বিন্দুত ছেদ কৰে আৰু
বেখাদাল BC ৰ সমান্তৰাল, তেন্তে প্রমাণ কৰা যে $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$.

ABC ত্ৰিভুজৰ BC বাহুৰ সমান্তৰাল এটি রেখা যদি AB এবং AC বাহুকে ক্ৰমে D এবং
E বিন্দুতে ছেদ কৰে তৰে প্রমাণ কৰো $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$.

26. Find the area of the triangle formed by the points A(5, 2), B(4, 7) and C(7, -4). 3

A(5, 2), B(4, 7) আৰু C(7, -4) বিন্দু কেইটাৰে গঠিত ত্ৰিভুজটোৰ কালি নির্ণয় কৰা।

A(5, 2), B(4, 7) এবং C(7, -4) বিন্দু তিনিটি দ্বাৰা গঠিত ত্ৰিভুজটিৰ কালি নির্ণয় কৰো।

27. A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the centre. Find the area of the corresponding minor segment. (Use $\pi = 3.14$) 3

10 ছে.মি. ব্যাসার্ধৰ এটা বৃত্তৰ এদাল জাহি কেন্দ্ৰত এটা সমকোণ কৰে। অনুকূপ গৌণ
বৃত্তখণ্ডৰ কালি নির্ণয় কৰা। (ব্যৱহাৰ কৰা $\pi = 3.14$)

10 সেমি ব্যাসার্ধৰ এটি বৃত্তৰ এটি জ্যা কেন্দ্ৰ এটি সমকোণ উৎপন্ন কৰে। অনুকূপ
গৌণ বৃত্ত খণ্ডৰ কালি নির্ণয় কৰো। ($\pi = 3.14$ নেবে)



Contd.

Section – D

28. The area of a rectangle gets reduced by 9 square units, if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units the area is increased by 67 square units. Find the length and breadth of the rectangle.

4

এটা আয়তৰ যদি দৈৰ্ঘ্যক 5 একক হ্ৰাস আৰু প্ৰস্থক 3 একক বৃদ্ধি কৰা হয়, তেন্তে ইয়াৰ কালি 9 বৰ্গ একক হ্ৰাস হয়। যদি ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্যক 3 একক আৰু প্ৰস্থক 2 একক বৃদ্ধি কৰা হয় তেন্তে কালি 67 বৰ্গ একক বৃদ্ধি পায়। আয়তটোৰ দীঘ আৰু প্ৰস্থ উলিউৱা।

যদি এটি আয়তৰ দৈৰ্ঘ্য 5 একক হ্ৰাস আৰু প্ৰস্থ 3 একক বৃদ্ধি কৰা হয়, তেবে-আয়তটিৰ কালি 9 বৰ্গ একক হ্ৰাস পায়। আৰু যদি দৈৰ্ঘ্য 3 একক আৰু প্ৰস্থ 2 একক বৃদ্ধি কৰা হয়, তেবে কালি 67 বৰ্গ একক বৃদ্ধি পায়। আয়তটিৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থ নিৰ্ণয় কৰো।

29. In an equilateral triangle, prove that three times the square of one side is equal to four times the square of one of its altitudes.

4

প্ৰমাণ কৰা যে, এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ এটা বাহুৰ বৰ্গৰ তিনিগুণ তাৰ এদাল উন্নতিৰ বৰ্গৰ চাৰিগুণৰ সমান।

প্ৰমাণ কৰো যে, এটি সমবাহু ত্ৰিভুজৰ এটি বাহুৰ বৰ্গৰ তিনিগুণ ত্ৰিভুজটিৰ এটি উন্নতিৰ বৰ্গৰ চাৰিগুণৰ সমান।

30. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 m longer when the Sun's altitude is 30° than when it is 60° . Find the height of the tower.

4

অনুভূমিক সমতলৰ ওপৰত থিয় হৈ থকা এটা গুহাৰ ছাঁ সূৰ্য্যৰ উন্নতি (উঠন কোণ) 60° হলে যিমান দীঘল হয়, উঠন কোণ 30° হলে তাতকৈ 40 মিটাৰ বেছি দীঘল হয়। গুহাটোৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰা।

এটি অনুভূমিক সমতলৰ ওপৰ দণ্ডায়মান এটি গুহাৰ ছায়াৰ দৈৰ্ঘ্য সূৰ্য্যৰ উন্নতি কোণ 60° হলে যত হবে তা অপেক্ষা 40 মিটাৰ বেশি হবে যখন সূৰ্য্যৰ উন্নতি কোণ 30° হয়। গুহাটিৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰো।

31. Prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal.

4

প্রমাণ করা যে এটা বহিঃস্থ বিন্দুৰ পৰা কৃতলৈ টনা স্পৰ্শক বোৰৰ দৈৰ্ঘ্য সমান ।

প্রমাণ কৰো যে, কোনো বহিঃস্থ বিন্দু ৰে কে কোনো বৃত্তৰ ওপৰ আঁকা স্পৰ্শক এলোৰ দৈৰ্ঘ্য সমান ।

Or/নাইবা/অথবা


Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus.



BELLAL HOSSAIN MONDAL

প্রমাণ করা যে এটা বৃত্তক স্পৰ্শ কৰা সামান্তৰিকটো এটা বৰ্গৰ ।

প্রমাণ কৰো যে, একটি বৃত্তকে পরিবেষ্টন কৰা সামান্তৰিকটি একটি বৰ্গৰ ।



32. Construct a triangle similar to a given triangle ABC with its sides equal to $\frac{3}{4}$ of the corresponding sides of the triangle ABC (i.e. of scale factor $\frac{3}{4}$)

4

এটা প্রদত্ত ত্ৰিভুজ ABC ৰ সন্মুখত এটা ত্ৰিভুজ আঁকা যাতে ইয়াৰ বাহুবোৰ ABC ত্ৰিভুজটোৰ অনুৰূপ বাহুবোৰৰ $\frac{3}{4}$ গুণৰ সমান (অৰ্থাৎ স্কেল ফেক্টৰ $\frac{3}{4}$ ৰ) ।

একটি প্রদত্ত ত্ৰিভুজ ABC ৰ সন্মুখত একটি ত্ৰিভুজ আঁকো যাৰ বাহুগুলো ABC ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহুগুলোৰ $\frac{3}{4}$ অংশ । (অৰ্থাৎ scale factor $\frac{3}{4}$) ।

33. A 20 m deep well with diameter 7 m is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 m by 14 m. Find the height of the platform. (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

5

20 মিটার গভীর আৰু 7 মিটাৰ ব্যাসৰ এটা কুৱী খান্দি তাৰ মাটিখিনি সমভাবে বহলাই 22 মিটাৰ $\times$ 14 মিটাৰ জোখৰ প্লেটফৰ্ম এখন প্ৰস্তুত কৰা হ'ল। প্লেটফৰ্ম খনৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰা। ($\pi = \frac{22}{7}$ লবা)

20 মিটাৰ গভীৰ আৰু 7 মিটাৰ ব্যাসৰ এটি কুয়ো খুঁড়ে সেই খুঁড়ামাটি সমভাবে বসিয়ে 22 মি $\times$ 14 মি মাপৰ এটি মঞ্চ (Platform) প্ৰস্তুত কৰা হলো। মঞ্চটিৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰো। ($\pi = \frac{22}{7}$ নেবে)

Or/নাইবা/অথবা

A container, opened from the top and made up of a metal sheet, is in the form of a frustum of a cone of height 16 cm with radii of its lower and upper ends as 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container, at the rate of ₹ 20 per litre. (Take $\pi = 3.14$)

16 ছে.মি. উচ্চতাৰ শংকুচ্ছেদ এটুকুৰাৰ নিচিনা ধাতুৰ পাত্ৰেৰে নিৰ্মিত মুখৰ খোলা পাত্ৰ এটাৰ তলৰ আৰু ওপৰৰ ভূমিৰ ব্যাসার্ধ ক্ৰমে 8 ছে.মি. আৰু 20 ছে.মি.। প্ৰতি লিটাৰত 20 টকা দৰত লোৱা গাখীৰেৰে পাত্ৰটো পূৰ্ণ কৰিবলৈ কিমান খৰচ পৰিব নিৰ্ণয় কৰা। ($\pi = 3.14$ লবা)

কতিপ শীৰ্ষ শংকু আকৃতিৰ ধাতু নিৰ্মিত পাত্ৰ এটিৰ উপৰেৰে দিকটি খোলা। পাত্ৰটিৰ উচ্চতা 16 সেমি, নীচৰ ভূমিৰ ব্যাসার্ধ 8 সেমি আৰু উপৰ প্ৰান্তৰ ব্যাসার্ধ 20 সেমি। প্ৰতি লিটাৰ দুধৰ মূল্য 20 টকা হিচাবে যদি এটিকে দুধ দিয়ে সম্পূৰ্ণ ভাবে ভৰ্তি কৰতে হয় তৰে প্ৰয়োজনীয় খৰচ নিৰ্ণয় কৰো। ($\pi = 3.14$ নেবে)



34. The marks obtained by 30 students of Class X of a certain school in a Mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the students.

Class interval	10 - 25	25 - 40	40 - 55	55 - 70	70 - 85	85 - 100
Number of students	2	3	7	6	6	6

তলৰ তালিকাত এখন বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ 30 জন শিক্ষার্থীৰ 100 নম্বৰৰ গণিতৰ প্ৰশ্নোত্তৰত এখনত পোৱা নম্বৰৰ সমিতিটো কৰা হ'ল। শিক্ষার্থী সকলে লাভ কৰা নম্বৰৰ মাধ্যম নিৰ্ণয় কৰা।

শ্ৰেণী বিভাজন	10 - 25	25 - 40	40 - 55	55 - 70	70 - 85	85 - 100
শিক্ষার্থীৰ সংখ্যা	2	3	7	6	6	6

কোনো এটি বিদ্যালয়ে, গণিত বিষয়ে 100 নম্বৰৰ পৰীক্ষায় দশম শ্ৰেণীৰ 30 জন ছাত্ৰৰ প্ৰাপ্ত নম্বৰ সমূহ নীচৰ তালিকায় দেওয়া হলো। ছাত্ৰদেৰ প্ৰাপ্ত নম্বৰেৰ মধ্য নিৰ্ণয় কৰো।

শ্ৰেণী বিভাগ	10 - 25	25 - 40	40 - 55	55 - 70	70 - 85	85 - 100
ছাত্ৰেৰ সংখ্যা	2	3	7	6	6	6

